

# CONSEILS POST-OPÉRATOIRES


## APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE, CERTAINES INDICATIONS SONT À OBSERVER



Appliquer une poche de glace 15 minutes par heure dès la fin de l'intervention lors des deux premiers jours  
Un hématome de la joue et/ou du cou peut survenir  
Celui-ci disparaîtra en une semaine et est normal.



Un petit saignement est normal le premier jour. En cas de persistance, mordez sur des compresses pendant 1h.  
Attention, il est recommandé de ne pas toucher la plaie ni de cracher et de se rincer la bouche dans les premières 48h.



Le lendemain, le brossage de dents se fait avec une brosse à dent souple, en évitant la plaie.  
Un traitement de bain de bouche sera à commencer 48h après l'intervention.



Veillez suivre le traitement prescrit par votre dentiste dès l'heure suivant l'intervention.  
L'aspirine est proscrite car elle favorise le saignement.



Veillez éviter toute activité physique pendant 2 à 4 jours.  
L'alcool et le tabac sont proscrits, perturbant la cicatrisation  
La nourriture doit être légère et molle les 2-3 premiers jours

EN CAS DE DOUTES, N'HÉSITÉZ PAS À DEMANDER  
CONSEIL À VOTRE DENTISTE